

# CASI CLINICI

---

Percorso di “Benessere, Make-up e Inestetismi da  
Terapia”

D.ssa Ida Minchella



# CASO CLINICO 1

C.Mateus, C.Robert - Club dermaweb



# SI TRATTA DI.... ?

1) Acne

2) Eruzione papulo-pustolosa follicolare



# RISPOSTA ESATTA : 2

- L'eruzione papulo-pustolosa follicolare viene descritta come « acneiforme » ma il termine non è adatto perché anche se le lesioni sono delle papulo-pustule follicolari predominanti sulle zone seborroiche (viso, cuoio capelluto, tronco) come nell'acne, non si osservano elementi ritenzionali o comedoni.



# DI CHE GRADO È?

- 1) Grado 1 : leggera
- 2) Grado 2 : moderata
- 3) Grado 3 : severa



# RISPOSTA ESATTA:

Grado 1: leggera



# DA QUALE FARMACO È PRINCIPALMENTE PROVOCATA ?

- 1) Sunitinib
- 2) Cetuximab
- 3) Sorafenib



# RISPOSTA ESATTA: 2

- E' l'effetto secondario più frequente ( > 75% pazienti) e più precoce (8-10 giorni dall'inizio del trattamento) del **Cetuximab** dovuto all'inibizione del recettore EGFR che induce un'inibizione della proliferazione dei cheratinociti e impatta sulla proliferazione e sulla differenziazione dell'epidermide e dei follicoli piliferi.





# COME VA TRATTATA?

- 1) Riduzione della dose del farmaco
- 2) Antibiotici sistemici
- 3) Antibiotici locali e/ o creme antisettiche a base di rame e zinco



# RISPOSTA ESATTA: 3

- Nel grado 1 sono utili i trattamenti sintomatici antiinfiammatori ed emollienti quali antibiotici locali e creme antisettiche .
- In certi casi sono ugualmente efficaci i dermocorticoidi.
- In aggiunta è utile mascherare le lesioni mediante un adatto maquillage non occlusivo (testato come non comedogeno).



# CASO CLINICO 2



# SI TRATTA DI ....?

- 1) Onicolisi da paclitaxel settimanale
- 2) Onicolisi da docetaxel trisettimanale
- 3) Perionichia da anti EGFR



# RISPOSTA ESATTA: 2

- Il trattamento con docetaxel trisettimanale provoca più frequentemente onicolisi.
- L'**onicolisi** è una patologia costituita da due fasi; una prima fase che riguarda un cambiamento nell'aspetto dell'unghia, una seconda fase in cui vi è il distacco dell'unghia dal letto ungueale.



# COME VA TRATTATA?

- 1) Riduzione del dosaggio del farmaco
- 2) Corticosteroidi topici
- 3) Antibiotici e antimicotici locali



# RISPOSTE ESATTE: 2 E 3

- Generalmente l'onicolisi può essere trattata con corticosteroidi topici.
- Per evitare batteri e infezioni fungine è consigliabile assumere farmaci antimicotici e antibiotici.
- Inoltre i pazienti devono evitare traumi, sostanze irritanti e umidità.



# CASO CLINICO 3





# SI TRATTA DI.....?

- 1) Sindrome mano-piede
- 2) Xerosi
- 3) Dermatite da contatto



# RISPOSTA ESATTA: 1

- Nota anche come **eritrodisestesia palmo-plantare** è caratterizzata, all'esordio, da una sensazione di formicolio e bruciore ai palmi delle mani e, meno frequentemente, alle piante dei piedi seguiti, nel giro di pochi giorni, da eritema e gonfiore intensi. Successivamente, dopo uno o due giorni, compaiono vescicole o bolle e ulcerazioni, più frequenti sulle aree sottoposte a pressione, spesso accompagnati da forti dolori.



# DI CHE GRADO È?

- 1) **Grado 1 : modificazioni cutanee minime senza dolori**
- 2) **Grado 2 : modificazioni cutanee con dolori**
- 3) **Grado 3 : modificazioni cutanee severe con dolori**



# RISPOSTA ESATTA:

- **Grado 3 : modificazioni cutanee severe con dolori**



# DA QUALE FARMACO È PRINCIPALMENTE PROVOCATA ?

- 1) Cetuximab
- 2) Capecitabina
- 3) Sorafenib



# RISPOSTA ESATTA: 3

E' la tossicità dermatologica più frequente dei TKI ( dal 10 al 63 % dei pazienti trattati con Sorafenib ) e si manifesta frequentemente nel corso del primo mese di trattamento.

Differisce da quella riportata per la CT .



# COME VA TRATTATA?

- 1) Riduzione della dose del farmaco
- 2) Trattamento antalgico
- 3) Dermocorticoidi locali



# RISPOSTE ESATTE: 1 ,2 E 3

- Il medico deve valutare una riduzione della dose del 50 % fino al ritorno al grado 1.
- Deve essere intrapreso un trattamento antalgico e applicare dermocorticoidi.
- Inoltre adottare misure quali: indossare calze o indumenti di cotone, scarpe morbide e comode





# CASO CLINICO 4



# SI TRATTA DI.....?

- 1) Eruzione papulo-pustolosa follicolare
- 2) Rash cutaneo
- 3) Dermatite da contatto




# RISPOSTA ESATTA: NESSUNA

- Si tratta di carcinoma mammario linfangitico con metastasi cutanee ulcerate ed infette.



# CASO CLINICO 5



# SI TRATTA DI.....?

- 1) Tossicità cutanea da cetuximab
- 2) Reazione allergica
- 3) Varicella



# RISPOSTA ESATTA: 1

- La tossicità cutanea da cetuximab si manifesta in più dell'80% dei pazienti principalmente come rash acneiforme. La maggior parte delle reazioni cutanee si sviluppano entro le prime tre settimane di terapia



# COME VA TRATTATA?

- Per lesioni di grado 2 e 3 è indicato il trattamento sistemico da 4 a 8 settimane con doxiciclina da 100 a 200 mg/die, tenuto conto anche dell'abituale regressione progressiva dell'eruzione.
- In certi casi deve essere prescritta una dose di mantenimento da 50 a 100 mg/die
- Non si sa, invece, se la profilassi con le cicline possa essere utile.
- E' probabile che le cicline siano attive in questa indicazione per la loro azione anti-infiammatoria.
- Ridurre la dose dell'anti EGFR, poiché l'eruzione è dose dipendente



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

